

HISTORIA DE CRIBADO EN MUJERES CON CÁNCER DE CÉRVIX

Burón A^{1,2}, Casamitjana M¹, Macià F¹, Sala M¹, Castells X¹.

1. Servei d'Avaluació i Epidemiologia Clínica, Hospital del Mar. IMAS. Barcelona 2. Unidad Docente de Medicina Preventiva y Salud Pública IMAS-UPF-ASPB.

INTRODUCCIÓN

El cáncer de cérvix continua representando uno de los tumores más prevalentes, a pesar de la disminución observada de su incidencia en los países desarrollados en las últimas décadas gracias a las políticas generalizadas de prevención secundaria. En Cataluña la incidencia estimada se sitúa entre 7,4 y 8,6 casos por 100.000 mujeres, y la mortalidad es de 1,7 por 100.000 mujeres. (Registro de cáncer de Tarragona 1993-1997 y Girona 1994-1997)

La citología exfoliativa está extendida en nuestro entorno como procedimiento de cribado en un marco oportunista; sin embargo a pesar de la existencia de un protocolo en Cataluña para la monitorización del proceso, sigue existiendo poca información sobre el uso de la citología de cérvix en nuestra población y su impacto en el desarrollo de cáncer posterior.

OBJETIVOS

- Describir los cánceres de cérvix diagnosticados en nuestro hospital durante el período 2003-2006, así como su evolución.
- Evaluar la historia de cribado de las mujeres con cáncer de cérvix del área de referencia del Hospital del Mar procedentes del Programa d'Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (PASSIR).
- Analizar las características de los cánceres de cérvix del área de referencia según la historia de cribado.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata de un estudio retrospectivo y descriptivo que estudia las mujeres diagnosticadas de cáncer de cérvix durante el período 2003-2006 en el Hospital del Mar. La fuente de datos fue, por un lado, el registro de tumores, del que se seleccionaron los casos de cáncer de cérvix diagnosticados durante dicho periodo, excluyendo los casos de displasia ligera o moderada (CIN I y CIN II).

Por otro lado se utilizó el registro de anatomía patológica que recoge información sobre todas las citologías realizadas a mujeres de más de 15 años en el contexto PASSIR. Se seleccionaron aquellas citologías de cribado realizadas entre el 2000 y el 2006 en el área de referencia del hospital, y se cruzó dicha base de datos con la de cánceres, obteniendo información sobre el cribado de cada mujer del área de referencia con cáncer de cérvix en los 3 años previos al diagnóstico.

Se consideró que una mujer tenía historia de cribado si en el periodo comprendido entre 6 y 36 meses anteriores al diagnóstico de cáncer se había realizado al menos una citología. Se excluyeron las citologías realizadas en los 6 meses previos al diagnóstico de cáncer por considerarse que pertenecían al proceso diagnóstico; y las posteriores a 36 meses por considerarse que no correspondían a un cribado sistemático.

Se calcularon las proporciones de mujeres con citologías previas dentro del PASSIR, y se comparan mediante el test de χ^2 las características de las mujeres previamente cribadas con aquellas que no tenían citología de cribado previa.

RESULTADOS

Tabla 1. Evolución de las características del total de casos de cánceres de cérvix diagnosticados en el Hospital del Mar entre 2003 y 2006.

	2003	2004	2005	2006	Global
Número de cánceres	49	59	54	42	204
País de origen: % Inmigrante	22,4	27,1	24,1	45,2	28,9
Edad %					
<=35	20,4	23,7	40,7	52,4	33,3
36-65	49	67,8	42,6	47,6	52,5
>65	30,6	8,5	16,7	0	14,2
% Area de referencia del H.del Mar	69,4	64,4	81,5	73,8	72,1
% Tipo Consulta Urgente	42,9	22	18,5	7,1	23,0
Características del cáncer:					
% de In situ	49	66,1	72,2	81	66,7
% de "Bien diferenciados"	49	50,8	72,2	83,3	62,7
% Tratamiento Radical	67,3	83,1	87	92,9	82,4

Figura 1. Distribución de las citologías de cribado previo realizadas entre 6 y 36 meses antes del diagnóstico de cáncer de cérvix en las mujeres del área de referencia del hospital (N=147).





Figura 2. Descripción de las características de los casos diagnosticados de cáncer de cérvix en el área de referencia del Hospital del Mar según la historia de cribado previo (N=147).



DISCUSIÓN

Del total de mujeres con cáncer de cérvix del área de referencia del Hospital del Mar, sólo un 28% tenían historia de cribado en el contexto del PASSIR, porcentaje reducido si se compara con la cobertura de citologías de cribado que recogen las encuestas de salud. En la evolución temporal, el aumento observado en los cánceres de mejor pronóstico podría estar relacionado con el aumento de casos entre la población más joven y con la introducción a mediados del año 2004 de la citología líquida como método diagnóstico de mayor sensibilidad que el convencional.

Los cánceres de las mujeres sin historia de cribado presentan características de mayor extensión y peor pronóstico que las que han sido cribadas.

Como limitaciones destacamos la no exhaustividad de las fuentes de datos, y la doble cobertura asistencial existente en esta especialidad en nuestro entorno.