

Trastornos de personalidad en un hospital monográfico

Garnier Lacueva, C; Castaño Asins, JR; Córcoles Martínez, D; Portillo Núñez, F; Rodríguez Uriarte, L; Salgado Serrano, P; Merino Torres, A; Bulbena Vilarrasa, A
IAPS, Hospital del Mar, IMAS, Barcelona

Objetivos

Describir el perfil del paciente que ingresa en un hospital psiquiátrico monográfico con diagnóstico principal de trastorno de personalidad (TP).

Material y métodos


Se recogen todos los pacientes con diagnóstico principal de trastorno de personalidad ingresados en el Centro Fòrum del Hospital del Mar durante el año 2006 y se procede a la descripción de sus características: número de ingresos, subtipo de TP, sexo, edad media, estancia media, procedencia y derivación.

Resultados


Durante el año 2006 requirieron ingreso en Centro Fòrum un total de 83 pacientes con el diagnóstico principal de TP, representando éstos un 8% del total de ingresos durante el mismo periodo. Los subtipos más frecuentes de TP han sido el Trastorno Límite de Personalidad y en TP No Especificado (cada uno de ellos representando un 43.37% de la muestra (entre ambos, 86.74%). Se observa predominio de sexo femenino (56.62%) sobre el masculino (43.37%). La edad media de estos pacientes ha sido de 36.83 años y su estancia media de 15 días.

En cuanto a su procedencia, la más frecuente ha sido "desde otros hospitales" (53%) seguida de "domicilio" (32.3%). La mayor parte de estos pacientes (51.8%) son derivados al alta al CSM para seguimiento.


INGRESOS TP




DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO



FRECUENCIA SUBTIPOS TP



DERIVACIÓN AL ALTA



Conclusiones

Los ingresos de Trastornos de Personalidad representan un 8% de los ingresos en el hospital estudiado. Sin embargo, no todos los trastornos de personalidad son susceptibles de un internamiento. Según datos, el 30% ha precisado ingresos, en la mayor parte de casos en Unidades de Agudos en las que no existe un programa de atención específica. Esta situación, con frecuencia distorsiona la evolución tanto del TP como del resto de pacientes hospitalizados. La frecuencia del trastorno y su alta morbilidad aportan un sólido argumento para plantear recursos que provean de equipos multidisciplinares adecuadamente entrenados que favorezcan una mejor evolución.

Bibliografía

- Trastornos de la personalidad. Madrid, 2003.
- Trastorno Borderline de personalidad. Madrid, 2004.