# Estudio sociodemográfico de la población psiquiátrica en programa de cirugía bariátrica

L. Martínez<sup>1</sup>, E. Ribera<sup>1</sup>, L. Pujol<sup>1</sup>, M. Angelats<sup>1</sup>, I. Ezquiaga<sup>1</sup>, V. Pérez-Solá<sup>1,2</sup>, P. Salgado<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Parc de Salut Mar, Barcelona, España.

<sup>2</sup>Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, España.

#### Introducción

En los últimos años se ha hecho especial énfasis en la importancia de la evaluación psicosocial de los pacientes candidatos a cirugía bariátrica como una parte esencial del plan terapéutico pre y post-operatorio. La utilidad de la evaluación psicosocial va más allá del despistaje de contraindicaciones para la cirugía y tiene especial interés para identificar factores tanto conflictivos como favorables que influirán en la adaptación y adherencia a los cambios comportamentales y de estilo de vida tras la cirugía. Es por tanto en definitiva un instrumento fundamental para realizar un plan terapéutico individualizado.

#### **Objetivos**

Conocer las características sociodemográficas y psicosociales de la población psiquiátrica incluida en el programa de cirugía bariátrica del Hospital del Mar de Barcelona.

## Métodos

De los 292 pacientes intervenidos por el servicio de cirugía general del Hospital del Mar entre Enero de 2010 y Noviembre de 2015 fueron analizados solamente los 104 con antecedentes psiquiátricos. Fueron recogidos datos sociodemográficos como sexo, edad, nivel de instrucción, ocupación, convivencia, dificultades económicas y etnia de los cuales se realizó un análisis de tipo descriptivo.

#### **Resultados**

La mayor parte de los pacientes intervenidos, un 78,8%, eran mujeres. La edad media de los pacientes era de 44,65 años mientras que la edad mínima era de 25 años y la máxima de 60. Un 4,8% de los pacientes eran de etnia gitana, el resto eran caucásicos. En cuanto a la convivencia, la mayoría de los pacientes vivía en la vivienda familiar propia (72,1%), únicamente un 10,6% vivía solo (ver gráfico 1). El 41,3% de los pacientes tenía empleo no cualificado, el 28,8% cualificado y un 13,7% estaba en paro (ver gráfico 2). Un 45,2% tenían estudios primarios, un 28,8% formación profesional y solamente un 13,5% eran titulados superiores (ver gráfico 3). Las dificultades económicas eran poco frecuentes, se daban en un 10,6% de los casos.

### gráfico 2



gráfico 1





gráfico 3



#### **Conclusiones**

El grupo de pacientes con antecedentes psiquiátricos que se someten a cirugía bariátrica es sociodemográficamente heterogéneo. La evaluación de los factores analizados es esencial para comprender la realidad psicosocial del paciente, anticipar las dificultades, fijar objetivos adaptados y formular adecuadamente un plan terapéutico individualizado.

# Bibliografía

- 1. Edwards-Hampton S, Wedin S. Preoperative psychological assessment of patients seeking weight-loss surgery: identifying challenges and solutions. Psychology Research and Behavior Management (2015).
- 2. Larjani S, Spivak I, Hao Guo M, Aliarzadeh B, Wang W, Robinson S, Sockalingam S, Aarts MA. Preoperative predictors of adherence to multidisciplinary follow-up care postbariatric surgery. Surgery for obesity and related diseases (2016).

