DIFERENCIAS EN PACIENTES CON TUS Y TUS CON TP EN SEGUIMIENTO AMBULATORIO EN CAS CON MEDIDA PENAL ALTERNATIVA

DIFFERENCES IN PATIENTS WITH SUBSTANCE USE DISORDER AND SUBSTANCE USE DISORDER AND PERSONALITY DISORDER IN TREATMENT IN HEALTH CARE CENTERS WITH ALTERNATIVE LEGAL MESURES

N. Ribas[1], L. Rodríguez[2], R. R. de la Cruz[3], C. Padrós[4], M. Jesús Sotelo[5], P. Mas[6], L. Sánchez[1], I. Infante[4], Z. Cañadas[1]

[1] INAD, Parc de Salut Mar, Spain. [2] Hospital Universitari Vall d'Hebron, Spain
[3] Althaia, Xarxa Assistencial Universitària Manresa, Spain. [4] Hospital Universitari Mutua de Terrassa, Spain
[5] Germanes Hospitalàries Benito Menni, Spain. [6] Consorci Hospitalari de Vic, Spain

Objetivo

Se pretende comparar entre pacientes con TUS y Duales con TUS y TP la situación legal y el seguimiento de las MPA en diferentes CAS de Barcelona.

Metodología

Se han recogido datos psicopatológicos y legales correspondientes a 177 pacientes con MPA en 8 CAS de la provincia de Barcelona activos durante los años 2014-2015. De los 177, 83 tienen TUS, 35 son duales TUS +TP y 59 son duales TUS no TP. El análisis de los datos se ha realizado con el programa SPSS.

Resultados

Pacientes con TUS: 92,77% hombres, 85,54% en rango de edad de 30 a 60 años, 37,35% alcohol droga principal y 34,94% cocaína, 73,49% con antecedentes legales, 36,36% con juicios pendientes, 41,46% su MPA tiene una duración de 1 a 3 años, 71,08% hace seguimiento en CAS, 55,42% realiza controles de orina y 65% se mantiene abstinente.

Pacientes duales (TUS + TP): 88,57% hombres, 85,71% en rango de edad de 30 a 60 años, 37,14% cocaína droga principal, 82,86% con antecedentes legales, 54,55% con juicios pendientes, 34,29% su MPA tiene duración inferior a un año o superior a 3, 80% realiza seguimiento en CAS, 62,68% hace controles de orina, 56,25% se mantiene abstinente.



Conclusiones

Existen diferencias porcentuales en la comparativa de ambos grupos, destacando los juicios pendientes, antecedentes legales y seguimiento con equipo multidisciplinar. Los pacientes duales con TP acumulan más juicios pendientes que los pacientes TUS, habiendo tendencia estadística en estas variables. Una ampliación de la muestra clarificaría si esta tendencia puede ser estadísticamente significativa.

INAD Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions
Parc de Salut MAR Barcelona