Prevalencia de patología dual en pacientes atendidos en las interconsultas hospitalarias de tóxicos del Hospital del Mar: un estudio descriptivo

Robles Martínez María[1,2], De Dios Felis, Mariona[1,2], Trabsa Biskri, Amira[1,2], Sedano Capdevila Alba[1,2], Gómez Sánchez Lafuente Carlos[1,2], Tamarit Claudio[1,2], García Sandra[1,2], Fonseca Francina[1,2,3], Torrens Marta[1,2,3]

[1] Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Hospital del Mar, Barcelona, Spain
[2] IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), Barcelona, Spain. [3] Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain

20ª JORNADAS NACIONALES DE PATOLOGÍA DUAL. Madrid del 19 al 21 de abril de 2018

Objetivos

Estimar la prevalencia de patología dual (PD) en pacientes ingresados en el Hospital del Mar (Barcelona) que son interconsultados por el servicio de toxicomanías durante los años 2009-2017. Describir las patologías mentales más frecuentemente asociadas al consumo de sustancias tóxicas.

Material y método

Estudio descriptivo de 2439 interconsultas realizadas por el servicio de interconsulta de Toxicomanías entre 2009-2017. Se determina la presencia de PD, el tratamiento pautado y la caracterización de la muestra mediante un cuestionario "ad hoc".

Resultados

El 70,9% de los pacientes presentaban un trastorno adictivo sin ningún otro trastorno psiquiátrico asociado.
El grupo de pacientes con PD (n=835) presentaba principalmente trastornos del eje I (16%), el 11,6% presentaba un trastorno de la personalidad y el 2,9% presentaban ambos. Las patologías del eje I más prevalentes fueron: trastorno depresivo (18,39%), delirium/demencia (16,51%) y psicosis (11,54%); las más prevalentes del eje II fueron: trastorno no especificado (20,81%), trastorno antisocial (9,8%) y trastorno límite (6,98%).

Tabla 1: Datos sociodemográficos de la muestra.

	PATOLOGÍA DUAL	NO DUALES
n	835 (34,2%)	1604 (65,8%)
Sexo femenino	26,5%*	18,70%
Solteros	37,8%*	33,30%
Casados o en pareja	25,60%	33,60%
Nacionalidad española	80,8%*	68,30%
Con trabajo	9,34%*	15,80%
En paro	36,80%	38,70%
Vive con la familia	76,20%	46,50%
Vive solo	27,70%	9,10%
Sin antecedentes legales	47,90%	58,70%
Vinculación previa a CAS	68,50%	53,20%
VIH +	29,10%	20,60%
VHC +	39,80%	30,90%
Hepatopatía crónica	46,50%	52,70%

*P>0,01

Tabla 2: Sustancia principal de abuso o dependencia.

	PATOLOGÍA DUAL	NO DUALES
Alcohol	53,6%*	67,20%
Heroína	15,40%	13,30%
Metadona	6,90%	7,60%
Cocaína	9,30%	5,40%
Tabaco	3,50%	2,70%
THC	1,60%	1,20%
Benzodiacepinas	3,10%	0,90%

*P>0,01

Figura 1: Principales diagnósticos psiquiátricos Eje I.



Figura 2: Principales diagnósticos psiquiátricos Eje II.



Conclusiones

La prevalencia de PD en pacientes hospitalizados que requieren interconsulta de toxicomanías es elevada (30,5%), siendo los trastornos depresivos el diagnóstico más frecuentemente asociado a un trastorno por consumo de sustancias, al igual que en estudios previos[1]. Se trata de un grupo de pacientes con mayor gravedad psicosocial que requerirán de intervenciones más intensivas.

Referencias

[1] Robles-Martínez, M., García-Carretero, M. Á., Gibert, J., Palma-Álvarez, R. F., Abad, A. C., Sorribes, M., Roncero, C. (2018). Differences between craving and health-related quality of life in patients with alcohol dependence with or without dual pathology in outpatient treatment: A descriptive study. Medicina Clínica, 23;150(2):49-55.

INAD Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions

Parc de Salut MAR Barcelona