SALUD Y DIFERENCIA DE GENERO EN LA ESQUIZOFRENIA

Hurtado Ruíz, Maria Gema,1 Fortuny Olivé, Joan Ramón, Carrió Diez, Elisenda, Sánchez González, Roberto, Campillo Sanz, Mª Teresa, Martí Bonany, Josep, Mateu Codina, Gerard, Sauras Quetcuti, Rosa, Galindo Guarin, Liliana, Farré Martínez Adrian, Palomo Nicolau, Antonio

1- Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions, Centre Emili Mira, Parc de Salut Mar, Barcelona
2- Institut de Neuropsiquiatria i Addicions, Centre Fòrum, Parc de Salut Mar, Barcelona
3- IMIM (Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques), Barcelona

Introducción

Existen diferencias de género en la esquizofrenia en cuanto al inicio, curso, neuroimagen y tratamiento. Es previsible que la comorbilidad somática sea también diferente, al igual que en población general.

Nuestro objetivo es conocer las diferencias de género en comorbilidad somática y con trastorno por uso de sustancias (TUS) en la esquizofrenia.

Métodos

Estudio transversal descriptivo con muestra de 1621 sujetos con esquizofrenia ingresados en unidad de agudos entre 2010-2016.

Resultados

FIGURA 1. GENERO Y EDAD



FIGURA 2. COMORBILIDAD GENERAL



FIGURA 3. COMORBILIDAD TRASTORNO POR USO DE SUSTANCIAS DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS



FIGURA 4. COMORBILIDAD SOMÁTICA DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS



FIGURA 5. COMORBILIDAD SOMATICA SIN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS



Discusión

Al igual que en población general, las mujeres con esquizofrenia presentan mayor prevalencia de enfermedades reumatológicas e igual prevalencia de diabetes, pero no ocurre así con la dislipemia e hipertensión (en población general es más frecuente en hombres).
Encontramos prevalencia de comorbilidad somática por debajo de la observada en población general (sesgo de Berkson, falta de acceso a atención sanitaria, falta de detección y recogida diagnóstica de patología médica), cuando la literatura describe frecuencias superiores en esta patología.
En esquizofrenia el porcentaje de hombres con TUS duplica al de las mujeres, encontrándose las máximas diferencias en el consumo de cannabis.

Referencias Bibliográficas

Usall J. Diferencias de género en la esquizofrenia. Rev Psiquiatría Fac Med Barna, 2003;30(5):276-287.
Carney CP, Laura Jones L, Woolson RF. Medical Comorbidity in Women and Men with Schizophrenia. A Population-Based Controlled Study. J Gen Intern Med, 2006; 21:1133–1137.

INAD Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions
Parc de Salut MAR Barcelona