23° Congreso de PATOLOGÍA DUAL
25-27 NOVIEMBRE 2021
patologia-dual.com
SEVILLA
SEPD DUAL DISORDERS
La Patología Dual como integradora de la salud mental desde las neurociencias

Patología dual y calidad de vida en pacientes ingresados en un Hospital General y atendidos por un servicio de interconsulta de adicciones

Fernando Dinamarca (1,2)*, Teresa Ferrer (3), Francina Fonseca (1,2,4), Francesc Casanovas Martinez (1) María Robles (1,2), Ana Maria Coratu (1,2), Alexandra Garcia-Guix (1,2), Rosa Sauras (1,2), Gerard Mateu (1,2), Lina Oviedo (1,2), Gabriel Vallecillo (1,2), Marta Torrens (1,2,4)

1. Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD), Barcelona, España. 2. Hospital del Mar Medical Research Institute-IMIM, Barcelona, España
3. Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Spain. 4. Universitat Pompeu Fabra-UPF, Facultad de Medicina. Barcelona, España

INTRODUCCIÓN

El abordaje de los pacientes adictos ingresados por complicaciones médicas habitualmente es efectuado por equipos de medicina y/o de enlace de psiquiatría siendo menos frecuente un modelo de interconsulta específica. Existe escasa bibliografía de la presencia de patología dual (PD) y calidad de vida en pacientes ingresados en un Hospital General.

OBJETIVO

Determinar la presencia de PD en pacientes atendidos por un servicio de interconsulta específica de adicciones, describiendo características clínicas y sociodemográficas, así como la calidad de vida autopercibida.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio transversal que incluye a pacientes ingresados por cualquier causa médico-quirúrgica, con excepción de infección por COVID-19, en el Hospital del Mar de Barcelona, entre enero a septiembre del año 2020, y requirieron valoración por el servicio de adicciones. Se excluyeron pacientes con barrera idiomática, deterioro cognitivo o delirium. Los pacientes incluídos firmaron un consentimiento informado del estudio.
Se recogieron variables sociodemográficas y clínicas y se aplicó la *Entrevista de Cribado de Diagnóstico Dual* (ECDD) y la escala de calidad de vida de la OMS. La muestra se dividió en dos grupos (pacientes con y sin PD) realizando un análisis comparativo mediante pruebas de chi-cuadrado y t de student.

RESULTADOS

Tabla 1. Variables clínicas y sociodemográficas según presencia de patología dual (ECDD)

36,7%

		Patología dual		
		si=25	no= 43	*Sig (p)*
Edad (años)		51,48	50,49	*NS*
Sexo	Hombres	18	37	*0,15*
	Mujeres	7	6	
Estado civil	Soltero/a	9	19	*0,6*
	Casado/a	4	12	
	Otros	12	12	
Origen	Nacional	20	28	*0,19*
	Extranjero	5	15	
Sustancia principal	Heroína	12	13	*0,26*
	Alcohol	11	21	
	Cocaína	2	5	
	Otros	0	4	
Ac. VIH	Positivo	9	4	*0,007*
	Negativo	16	39	
Ac. VHC	Positivo	9	11	*0,3*
	Negativo	16	32	
Puntuación total escala OMS (0-100)		42,08	53,67	*NS*

Gráfico 1. Diagnósticos patología dual



CONCLUSIONES

- Más de un tercio de nuestra muestra presentó PD, existiendo en casi la totalidad de estos pacientes un mínimo de 2 diagnósticos asociados al trastorno por consumo.
- El principal diagnóstico de PD fue depresión, similar a lo descrito en otras muestras de pacientes atendidos por servicios de interconsulta de psiquiatría.
- La presencia de patología dual estuvo asociada a mayor proporción de serologías positivas para VIH y una tendencia de peores índices de calidad de vida en los pacientes con PD.
- Es necesario investigar en muestras de mayor tamaño para determinar la real magnitud de estas diferencias y optimizar el diagnóstico y manejo de estos pacientes.

REFERENCIAS

Mestre-Pintó, J.I.; Domingo-Salvany, A.; Martín-Santos, R.; Torrens, M.; PsyCoBarcelona Group. Dual Diagnosis Screening Interview to Identify Psychiatric Comorbidity in Substance Users: Development and Validation of a Brief Instrument. Eur Addict Res 2014; 20: 41-48.
World Health Organization (WHO). Use of Well-Being Measures in Primary Health Care/ TheDepCare Project, 1998. Available: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0016/130750/E60246.pdf
Walker, J.; Burke, K.; Wanat, M.; Fisher, R.; Fielding, J.; Mulick, A.; Puntis, S.; Sharpe, J.; Esposti, M.D.; Harriss, E.; Frost, C.; Sharpe, M. The prevalence of depression in general hospital inpatients: a systematic review and meta-analysis of interview-based studies. Psychol Med. 2018 Oct;48(14):2285-2298.

**Correspondencia a: fdinamarca@psmar.cat*

INAD Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions
Parc de Salut MAR Barcelona