FOLIE À DEUX: A PROPÓSITO DE UN CASO CLÍNICO EN LA ADOLESCENCIA

Baeza Tena E; Martinez Sánchez JA; Nascimento Osorio MT; Diaz Digon L; Sorli Martinez de Oraa R, Siñol Lopez P; Batlle Vila S; Martin López LM.

Centro de Salud Mental Infanto Juvenil (CSMIJ Sant Marti). Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD). Parc de Salut Mar (Barcelona)

Introducción

Folie à deux es un trastorno mental poco común que presenta las siguientes características:



Objetivo

A través de un caso clínico de Folie à deux en la adolescencia, realizar una revisión bibliográfica del trastorno.

Resultados

Caso clínico: Paciente de 13 años derivada al Centro de Salud Mental Infanto Juvenil desde Urgencias por autolesiones en antebrazo. Explica que las realiza desde hace 2 años para disminuir dolor emocional debido a la mala relación con la madre y hermano y posible bullying en el colegio.

Antecedentes personales y familiares de interés: Embarazo de riesgo (madre con Lupus eritematoso), parto eutócico y a término. Desarrollo madurativo dentro de los límites de la normalidad. Socialización sin dificultades. Padres separados desde 2009, actualmente convive con el padre. Seguimiento en CSMIJ en 2010-2011 por bloqueo emocional debido a separación familiar traumática. AMP: Padre OD trastorno delirante tipo persecutorio.

Exploración psicopatológica: Puntuaciones no significativas en las escalas CBCL, YRS, TRF, BDI y CDI.

Situación actual: Paciente con sintomatología delirante de persecución: culpabiliza a la madre y al hermano del comportamiento de terceros. Sintomatología ansiosa antes de ir al colegio, manifiesta querer cambiarse de instituto por posible bullying. Actitud defensiva ante los profesionales, poco comunicativa, sonrisa infantiloide, suspicacia, discurso aprendido y dificultades atencionales.

Conclusiones

Trastorno poco estudiado debido a la dificultad en el seguimiento de los pacientes. La distinción entre paciente primario y secundario ayuda en la determinación del tipo de tratamiento. Importante analizar el momento adecuado de la separación para una mayor vinculación al tratamiento.

Bibliografía

1. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV. 4 ed. Barcelona: Masson, 2002.
2. Arnone D, Patel A, Tan GM. The nosological significance of Folie à Deux: a review of the literature. Ann Gen Psychiatry. 2006 Aug 8;5:11.
3. Christensen, Richard C. and Ramos Erwin. Case report The Social and Treatment Consequences of a Shared Delusional Disorder in a Homeless Family.
4. Innovations in Clinical Neuroscience 42 [Volume 8, Number 4, APRIL 2011] 42-44 5. Du Saulle, Legrand. Le délire des persécutions Paris. 1874. R. Plox Eds.

INAD Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions

Parc de Salut MAR Barcelona