Prevalencia de diagnósticos y principales tóxicos en la unidad de patología dual de agudos (UPDA)

Gerard Lagomazzini Garrido, Zaida Cañadas Aceña, Nuria Iranzo Céspedes, Maria del Mar López García, Elisabet Gil Mico, Noelia Muñoz Belver, Inés Vallejo Ramal, Daniel García Fuentes, Gerard Angel Mateu Codina, Albert Pratdesava Villanueva, Tamara Vates Cátedra, Sara Casas Lirio, Raquel Corina Sánchez Lafuente

Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions (INAD). PSMAR. Barcelona

Introducción

En UPDA atendemos a pacientes con uso, abuso, dependencia y/o trastornos por uso de sustancias junto con un trastorno mental grave. Aprender sobre la patología dual es la razón que nos motiva a investigar qué drogas y que trastornos mentales son más comunes en los usuarios que atendemos.

Objetivos

Conocer la prevalencia de diagnósticos e identificar las sustancias de consumo de los usuarios ingresados en UPDA en el periodo de estudio.

Metodología

Estudio descriptivo longitudinal en el que se incluyen los pacientes ingresados en la UPDA de enero a septiembre 2022 (N=203). Se incluyen las variables diagnósticas y sustancias principales de consumo.

Resultados

Tras una recogida de datos de los diferentes casos que se reciben en la unidad, **las drogas que más se consumen** son:

- **Cannabis (CNN): 79**
- **Alcohol (OH): 51**
- **Cocaína (COC): 48**
- Metanfetamina (MET): 13
- Anfetamina: 6
- Ketamina (KET): 2
- Heroína (H): 1
- Metilendioximetanfetamina (MDMA): 1
- Morfina (MOP): 1
- Abuso de Benzodiacepinas: 1

Los **principales diagnósticos diferenciales** (según clasificación DSM V) son:

-Espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos: 100
-Trastornos relacionados con el trauma y el estrés: 24
-Trastornos de personalidad: 21
-Trastornos bipolares y relacionados: 20
-Trastornos depresivos: 12
-Trastornos de ansiedad: 11
-Trastornos adictivos y relacionados con sustancias: 9
-Trastornos del neurodesarrollo: 4
-Otros trastornos mentales: 2

DROGAS



Diagnósticos diferenciales



Conclusiones

El consumo de cocaína (COC) y cannabis (CNN) muestran mayor prevalencia en aquellos diagnósticos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El alcohol (OH) muestra mayor número de casos en diagnósticos de trastornos de la personalidad, depresivos y relacionados con el trauma y el estrés.

Bibliografía

1- Parc de Salut Mar. Proceso de atención a las adicciones [Internet]. Barcelona: Parc de Salut Mar, 2022 [consultado el 29/1/22]. Disponible en: https://www.parcdesalutmar.cat/es/inad/processos-assistencials/atencio-addiccions/

2- KRieger DM, B, Reppold CT, Fialho PO, Pires GB, Terra MB. Personality disorder and substante related disorders: a six-month follow-up study with a Brazilian sample. J bras psiquiatr [Internet]. 2016 (consultado el 30/1/2023); 65 (2). Disponible en: https://www.scielo.br/j/jbpsiq/a/XZsFrMhgs45BmCBcKBVNWxk/?lang=en#

INAD Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions

Parc de Salut MAR Barcelona